



20 x 60 g

Ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans
To stabilize water and electrolyte balance
Zur Stabilisierung des Wasser- und Elektrolythaushalts
Pour stabiliser du bilan des électrolytes et de l'eau

Top Fizz

Aanvullend
dieetvoeder voor
kalveren. In de vorm van een
bruistablet voor orale
toediening. Stabilisatie van de
water- en elektrolytenbalans
ter ondersteuning van de
fysiologische spijsvertering.

Samenstelling
Lactose, natriumbicarbonaat,
dextrose, natriumchloride,
kaliumchloride,
magnesiumstearaat.

Toevoegingsmiddelen
Sensoriële
toevoegingsmiddelen
Vanille aroma

Technologische
toevoegingsmiddelen
E330 Citroenzuur

Analytische bestanddelen
Calcium, Ca <0,1%; Fosfor,
P <0,1%; Natrium, Na 8,8%;
Magnesium, Mg <0,1%;
Kalium, K 3,6%; Chloor, Cl
8,3%; Ruw Eiwit <0,5%; Ruw
Vet <0,5%; Ruw As 30,9%;
Ruwe Celstof <0,5%

Dosering
Los één tablet op in 2 liter
warm water (ongeveer 50
° C) per maaltijd. Bij lichte
verteringsproblemen de
oplossing voeren tussen de
melkvoedingen. Bij ernstige
verteringsproblemen kan
een melkvoeding vervangen
worden. Herhaal gedurende
2 of 3 dagen. Dieren met
een leumaag moeten niet
tegelijkertijd melk gevoed
worden.

Gebruiksaanwijzing
• Gebruik Topro Top Fizz
in geval van risico op
spijsverteringsstoornissen
(diarree), tijdens en na die
stoornissen.

• Aangeraden wordt om vóór
gebruik of vóór verlenging van
de gebruiksduur een dierenarts
te raadplegen.

Bewaaraadvies
Droog opslaan, beschermd
tegen extreme temperaturen
en buiten het bereik van
kinderen.

Tenminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

Aliment
complémentaire
diététique pour veaux. Sous
forme de comprimé
effervescent pour
administration orale.
Stabilisation du bilan des
électrolytes et de l'eau afin de
faciliter la digestion
physiologique.

Composition
Lactose, bicarbonate de
sodium, dextrose, chlorure de
sodium, chlorure de potassium,
stéarate de magnésium.

Additifs
Additifs Sensoriels
Arôme de vanille

Additifs technologiques
E330 Acide citrique

Constituants analytiques
Calcium, Ca <0,1%;
Phosphore, P <0,1%; Sodium,
Na 8,8%;
Magnésium, Mg <0,1%;
Potassium, K 3,6%;
Chlore, Cl 8,3%;
Protéine brute <0,5%;
Matières grasses brutes
<0,5%; Cendres brutes
30,9%; Cellulose brute <0,5%

Dosage
Dissolvez un comprimé dans
2 litres d'eau chaude (environ
50 ° C) par repas. Pour les
problèmes digestifs légers,
donnez la solution entre
les tétées de lait. En cas de
problèmes digestifs graves,
une tétée peut être remplacée.
Répétez pendant 2 ou 3 jours.
L'administration simultanée
de lait doit être évitée chez les
animaux ayant une cailllette.

Mode d'emploi
• Utilisez Topro Top Fizz en cas
de risque de troubles digestifs
(diarrhée), pendant et après
ceux-ci.
• Avant utilisation et avant
prolongation de la durée
d'utilisation, il est recommandé
de consulter un vétérinaire
Indiquer dans les mentions
d'étiquetage

Conditions de stockage
Conserver à l'abri du gel, de
l'humidité et de températures
excessives, et hors de la portée
des enfants.

Date limitée de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

Dietic complementary
feed for calves. In the
form of an effervescent tablet
for oral administration.
Stabilisation of water and
electrolyte balance to support
the physiological digestion.

Composition
Lactose, sodium bicarbonate,
dextrose, sodium chloride,
potassium chloride,
magnesium stearate.

Additives
Sensory additives
Vanilla aroma

Technological additives
citric acid

Analytical components
Calcium, Ca <0.1 %;
Phosphorus, P <0.1 %;
Sodium, Na 8.8 %;

Magnesium, Mg <0.1 %,
Potassium, K 3.6 %,
Chlorine, Cl 8.3 %
Crude protein <0.5%, Crude
fat <0.5%, Crude ash 30.9%,
Crude fiber <0.5%

Dosage
Dissolve one tablet in 2 liters
of warm water (around 50 ° C)
per meal. For mild digestive
problems, feed the solution
between milk feedings. A milk
feeding can be replaced in case
of serious digestive problems.
Repeat during 2 or 3 days.
Simultaneous feeding of milk
should be avoided in animals
with Abomasum

Instructions for use
• Use Topro Top Fizz in case
of risk of, during periods of,
or recovery from digestive
disturbance (diarrhea).

• It is recommended that
advice from a veterinarian be
sought before use and before
extending the period of use.
Storage Instructions
Store dry, protected from
extreme temperatures, and out
of reach of children.

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

Diätetisches
Ergänzungsfutter-
mittel für Kälber. In Form einer
Brausetablette zur oralen
Verabreichung. Stabilisierung
des Wasser- und
Elektrolythaushalts zur
Unterstützung der
physiologischen Verdauung.

Zusammensetzung
Lactose, Natriumbicarbonat,
Dextrose, Natriumchlorid,
Kaliumchlorid,
Magnesiumstearat.

Zusatzstoffe
Sensorische Zusatzstoffe
Vanille aroma

Technologische Zusatzstoffe
Zitronensäure

Analytische Bestandteile
Calcium, Ca <0,1%; Phosphor,
P <0,1%; Natrium, Na 8,8%;
Magnesium, Mg <0,1%;
Kalium, K 3,6%;
Chlor, Cl 8,3%;
Rohprotein <0,5%; Rohfett
<0,5%; Rohasche 30,9%;
Rohfaser <0,5%

Fütterung
Pro Mahlzeit eine Tablette in
2 Liter warmes Wasser (ca.
50 ° C) auflösen. Bei leichten
Verdauungsproblemen füttern
Sie die Lösung zwischen
den Milchmahlzeiten.
Bei schwierige
Verdauungsproblemen kann
eine Milchmahlzeit ersetzt
werden. Wiederholen für 2
oder 3 Tage. Die gleichzeitige
Verfütterung von Milch sollte
bei Tieren mit Labmagen
vermieden werden.

Gebrauchsanweisung
• Verwenden Sie Topro Top
Fizz im Fall von, während oder
nach Verdauungsstörungen
(Durchfall).

• Es wird empfohlen, vor
der Verwendung oder
vor Verlängerung der
Fütterungsdauer den Rat eines
Tierarztes einzuholen.

Lagerungshinweise
Trocken lagern, vor extremen
Temperaturen schützen und
außer Reichweite von Kindern
lagern.

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

Top Fizz



20 x 60 g



Topro: registered trademark of
Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002

GMP+ FSA-geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert
Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322

