



12 x 90 g

Mineraal dieetvoeder
 voor melkkoeien in vorm van een bolus voor orale toediening, ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcaemie.

Toepassing

De Topro Calcium Bolus is een snel oplosbaar calciumsupplement dat toegeleid wordt aan melkkoeien vanaf de eerste tekenen van kalven tot twee dagen na het kalven.

Samenstelling

Dicalciumfosfaat, magnesium-oxide, calciumstearaat, sorbitol.

Analytische bestanddelen

Calcium, Ca22,2 %
Magnesium, Mg0,8 %
Natrium, Na	<0,1 %
Fosfor, P6,5 %

Toevoegingsmiddelen
Nutritionele toevoegingsmiddelen
 3a671 Vitamine D3 200.000 IE/kg
Technologische toevoegingsmiddelen
 E238 Calciumformiaat
 E282 Calcium propionate

Dosering

- 2 bolussen 12 tot 24 uur voor het kalven.
- 2 bolussen onmiddellijk na het kalven.
- 1 of 2 bolussen 10 tot 12 uur na het kalven.
- 1 of 2 bolussen 24 uur na het kalven.

Dosering na een calciuminfusie

- 2 bolussen 2 uur na het infusie.
- 2 bolussen 12 uur na het infusie.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschutter (folie verwijderen). Niet toedienen aan een liggend dier.
- Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoerdeskundige in te winnen.

Bewaaradvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 20 g calcium.

Tenminste houdbaar tot

Zie verpakking.

Batchnr.

Zie verpakking.

Aliment minéral
 diététique pour vaches laitières en forme de bolus pour administration orale. Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie subclinique.

Application

Le bolus de Calcium Topro est un supplément de calcium rapidement disponible appliquée aux vaches à partir des premiers signes de vêlage jusqu'à 2 jours après vêlage.

Composition

Phosphate d'calcium, oxyde de magnésium, stéarate de calcium, sorbitol.

Constituants analytiques

Calcium, Ca22,2 %
Magnésium, Mg0,8 %
Sodium, Na	<0,1 %
Phosphore, P6,5 %

Additifs
Additifs nutritionnelles
 3a671 Vitamine D3 200.000 UI/kg
Additifs technologiques
 E238 Formiate de calcium
 E282 Propionate de calcium

Dosage

- 2 boli 12 - 24 h avant le vêlage.
- 2 boli immédiatement après le vêlage.
- 1 ou 2 boli 10 - 12 h après le vêlage.
- 1 ou 2 boli 24 h après le vêlage.

Dosage après une infusion de calcium

- 2 boli 2 h après l'infusion.
- 2 boli 12 h après l'infusion.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolius adapté (retirer la film). Ne pas administrer à un animal couché.
- Avant son usage il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition animale.

Conditions de stockage

Conserver frais et sec, hors de portée d'enfants. Protéger contre le gel.

Chaque bolus contient 20 g de calcium.

Date limité de conservation

Voir emballage.

No de lot

Voir emballage.

Dietetic mineral feed for dairy cows in the form of a bolus for oral administration, to reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia.

Applikation

The Topro Calcium bolus is a rapidly dissolving calcium supplement administered to dairy cows from the first signs of calving to two days after calving.

Composition

Dicalcium phosphate, magnesium oxide, calcium stearate, sorbitol.

Analytical constituents and amounts

Calcium, Ca22,2 %
Magnesium, Mg0,8 %
Natrium, Na	<0,1 %
Phosphorus, P6,5 %

Additives
Nutritional additives
 3a671 Vitamin D3 200,000 IU/kg
Technological additives
 E238 Calcium formate
 E282 Calcium propionate

Dosage

- 2 boluses 12 to 24 hours before calving.
- 2 boluses immediately after calving.
- 1 or 2 boluses 10 to 12 hours after calving.
- 1 or 2 boluses 24 hours after calving.

Dosage after a calcium infusion

- 2 boluses 2 hours after the infusion.
- 2 boluses 12 hours after the infusion.

Instructions for use

- Administer with a suitable bolus applicator (remove foil). Do not administer to a lying animal.
- Before use, we recommend taking advice from a veterinarian or nutritionist.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out of reach of children. Protect against frost.

Each bolus contains 20 g calcium.

Best before

See packaging.

Batch No.

See packaging.

Diätetisches Mineralfuttermittel für Milchkühe in Form eines Bolus zur oralen Verarbeitung, zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und subklinischer Hypokalzämie.

Anwendung

Die Topro Calcium Bolus ist ein schnell löslicher Calciumzusatz, der an Milchkühe zur Verbesserung der Calciumversorgung ab den ersten Anzeichen vor dem Kalben bis zu zwei Tage nach dem Kalben verfüllt wird.

Zusammensetzung

Dicalciumphosphat, Magnesium-oxid, Calciumstearat, Sorbitol.

Analytische Bestandteile

Calcium, Ca22,2 %
Magnesium, Mg0,8 %
Natrium, Na	<0,1 %
Phosphor, P6,5 %

Zusatstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg
 3a671 Vitamin D3 200.000 IE/kg
Technologische Zusatzstoffe
 E238 Calciumformiat
 E282 Calciumpropionat

Fütterung

- 2 Boli 12 bis 24 Stunden vor dem Kalben.
- 2 Boli unmittelbar nach dem Kalben.
- 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 10 bis 12 Stunden nach dem Kalben.
- 1 oder 2 Boli je nach Bedarf 24 Stunden nach dem Kalben.

Fütterung nach einer Calciuminfusion

- 2 Boli 2 Stunden nach der Infusion.
- 2 Boli 12 Stunden nach der Infusion.

Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem geeigneten Bolus-Applikator (Folie entfernen). Nicht an ein liegendes Tier verabreichen.
- Es wird empfohlen vor der ersten Anwendung den Rat eines Futtermittelexperten einzuholen.

Lagerungshinweise

Kühl, trocken und außer Reichweite von Kindern lagern. Vor Frost schützen.

Jeder Bolus enthält 20 g Calcium

Mindestens haltbar bis

Siehe Verpackung.

Batch-Nr.

Siehe Verpackung.

Calcium
 Ter verminderen van het risico op melkziekte en subklinische hypocalcaemie
 subklinische hypocalcaemie
 Zur Verringering des Risikos von Melchfieber und subklinischer Hypokalzämie
 To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia
 subklinische Hypokalzämie
 Reduktion du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie

Calcium

subclinique

hypocalcaemie

subklinischer Hypokalzämie

Zur Verringering des Risikos von Melchfieber und subklinischer Hypokalzämie

To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia

hypocalcaemic

subklinische Hypokalzämie

Ter verminderen van het risico op melkziekte en subklinische

hypocalcaemie

subklinische Hypokalzämie


hypocalcaemic

Calcium

Topro: registered trademark of
Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
aFR24037002

GMP+ FSA-geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert
Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



12 x 90 g

