



subclinique

Réduction du risque de fièvre vitulaire et d'hypocalcémie

subklinischer Hypokalzämie

Zur Verringerung des Risikos von Milchfieber und

To reduce the risk of milk fever and subclinical hypocalcaemia

hypocalcémie

Ter vermindering van het risico op melkziekte en subklinische

Phosphorus



12 x 85 g

Mineraal diëetvoeder
voor melkkoeien in de
vorm van een bolus voor orale
toediening, ter vermindering
van het risico op melkziekte en
subklinische hypocalcémie.

Toepassing
De Topro Phosphorus bolus
is een snel oplosbaar fosfor-
en calciumsupplement
dat toegediend wordt aan
melkkoeien in perioden
van hoge fosfor- en
calciumbehoefte.

Samenstelling
Dicalciumfosfaat,
mononatriumfosfaat,
calciumstearaat.

Analytische bestanddelen
Calcium, Ca 18,2 %
Magnesium, Mg 0,8 %
Natrium, Na 4,2 %
Fosfor, P 18,1 %

Dosering
• 2 bolussen bij de eerste
tekenen van kalven.
• 2 bolussen onmiddellijk na
het kalven.

**Dosering na een
calciuminfuus tegen
melkziekte**

• 2 bolussen zodra de koe
weer opstaat.
• 2 bolussen 10 – 12 uur
nadat de koe weer is gaan
staan.

Gebruiksaanwijzing

- Toedienen met een geschikte bolusschieter (folie verwijderen). Niet toedienen aan een liggend dier.
- Aanbevolen wordt om voor het gebruik het advies van een diervoederdeskundige in te winnen.

Bewaaradvies

Koel, droog en buiten het bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst.

Elke bolus bevat 15 g fosfor en 15 g calcium.

Tenminste houdbaar tot
Zie verpakking.

Batchnr.
Zie verpakking.

Aliment diététique
pour vaches laitières
sous forme de bolus pour
administration orale,
Réduction du risque de fièvre
vitulaire et d'hypocalcémie
subclinique.

Application

Phosphorus Topro est un
supplément de phosphore et
calcium rapidement soluble
pour vaches laitières après
vélage en cas de carence
en phosphore ou comme
prophylaxie en cas de besoin
élevé en phosphore et calcium.

Composition
Phosphate dicalcique,
phosphate monosodique,
stéarate de calcium.

Constituants analytiques
Calcium, Ca 18,2 %
Magnésium, Mg 0,8 %
Sodium, Na 4,2 %
Phosphore, P 18,1 %

Dosage
• 2 bolus aux premiers signes
de vélage.
• 2 bolus immédiatement après
le vélage.

**Dosage après une infusion
docalcium**

• 2 bolus une fois la vache est
debout.
• 2 bolus 10 – 12 heures après
que la vache ait ressuscité.

Mode d'emploi

- Appliquer avec un lance-bolus adapté (retirer le film). Ne pas administrer à un animal couché.
- Avant son usage il est recommandé de demander l'avis d'un expert en nutrition animale.

Conditions de stockage
Conserver frais et sec, hors
de portée d'enfants. Protéger
contre le gel.

**Chaque bolus contient 15
g de phosphore et 15 g de
calcium.**

Date limité de conservation
Voir emballage.

No de lot
Voir emballage.

Dietetic mineral feed
for dairy cows in the
form of a bolus for oral
administration, to reduce the
risk of milk fever and
subclinical hypocalcaemia.

Application

The Topro Phosphorus bolus
is a rapidly dissolving phosphorus
and calcium supplement,
administered to dairy cows in
periods of high phosphorus
and calcium demand.

Composition
Dicalcium phosphate,
monosodium phosphate,
calcium stearate.

Analytical constituents and amounts

Calcium, Ca 18,2 %
Magnesium, Mg 0,8 %
Sodium, Na 4,2 %
Phosphorus, P 18,1 %

Dosage

- 2 boluses at the first signs of
calving.
- 2 boluses immediately after
calving.

**Dosage after a calcium
infusion against ketosis**

- 2 boluses once the cow
stands up again.
- 2 boluses 10 – 12 hours after
the cow has risen again.

Instructions for use

- Administer with a suitable
bolus applicator (remove foil).
Do not administer to a lying
animal.
- We recommend consulting a
veterinarian or nutritionist
before use.

Storage instructions

Keep product cool, dry and out
of reach of children. Protect
against frost.

**Each bolus contains 15 g
phosphate and 15 g calcium.**

Best before
See packaging.

Batch No.
See packaging.

**Diätetisches
Mineralfuttermittel für
Milchkühe in Form eines Bolus
zur oralen Verabreichung, zur
Verringerung des Risikos von
Milchfieber und subklinischer
Hypokalzämie.**

Anwendung

Topro Phosphorus ist ein
schnell löslicher Phosphor- und
Calciumzusatz und versorgt
Kühe in Phasen eines erhöhten
Phosphor und Calciumbedarfs.

Zusammensetzung
Dicalciumphosphat,
Mononatriumphosphat,
Calciumstearat.

Analytische Bestandteile
Calcium, Ca 18,2 %
Magnesium, Mg 0,8 %
Natrium, Na 4,2 %
Phosphor, P 18,1 %

Fütterung

- 2 Bolus bei den ersten
Anzeichen des Kalbens.
- 2 Bolus direkt nach dem
Abkalben.

**Fütterungshinweis einer
Milchfieber-Infusion**

- 2 Bolus wenn die Kuh wieder
aufstehen kann.
- 2 Bolus 10 bis 12 Std nachdem
die Kuh wieder aufgestanden
ist.

Gebrauchsanweisung

- Verfütterung mit einem
geeigneten Bolus-Applikator
(Folie entfernen). Nicht an ein
liegendes Tier verabreichen.
- Es wird empfohlen vor der
ersten Anwendung den Rat
eines Futtermittelexperten
einzuholen.

Lagerungshinweise
Kühl, trocken und außer
Reichweite von Kindern lagern.
Vor Frost schützen.

**Jeder Bolus enthält 15 g
Phosphor und 15 g Calcium.**

Mindestens haltbar bis
Siehe Verpackung.

Batch-Nr.
Siehe Verpackung.

Phosphorus



12 x 85 g




Topro: registered trademark of
Bio Enterprise B.V
Sluiskolk 3
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl www.topro.nl

Erkenningsnr. Producent
Registration No. manufacturer
Zulassungs-Nr. Hersteller
No agrément du producteur
αFR24037002


GMP+ FSA-geborgd
GMP+ FSA assured
GMP+ FSA gesichert
Garanti GMP+ FSA
GMO controlled
PDV103322



1



2



3

