

Samenstelling

Glucose-anhydraat, natriumchloride, natriumbicarbonaat, kaliumchloride.

Analytische bestanddelen

Ruw eiwit 2,2%, ruw vet 0,6%, ruwe as 21,4%, ruwe celstof <0,1%, natrium 9,2%, kalium 0,9%, chloride 10,1%, lysine 0,0%, methionine 0,0%

Gebruiksaanwijzing en dosering

Gebruik Topro Electrolyte TopMix in geval van risico op spijsverteringsstoornissen (diarree), tijdens en na die stoornissen. Los 25 gram Electrolyte TopMix op per liter water. Voeren gedurende 2 à 3 dagen en verdeeld over 3-4 porties per dag. Verstrek 10% van het lichaamsgewicht aan elektrolytenoplossing per dag op lichaamstemperatuur (voorbeeld: een kalf van 45 kg, 3 keer per dag 1,5 liter). Indien mogelijk de hoeveelheid elektrolytenoplossing verminderen en de melkgift opvoeren.



8 713296 021001



2 kg

Electrolyte TopMix

Aanvullend dieetvoeder ter stabilisatie van de water- en elektrolytenbalans ter ondersteuning van de fysiologische spijsvertering.



Aangeraden wordt om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur een dierenarts te raadplegen.

Productiedatum

Tenminste houdbaar tot

Batchnr.

Bewaaradvies

Verpakking na gebruik weer sluiten. Koel, droog en buiten bereik van kinderen bewaren. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht. Productzekerheid en veiligheid alleen gegarandeerd bij juiste bewaarcondities.

Erkenningsnr. producent

αNL1014

GMP+ FSA geborgd

GMO controlled

PDV103322

Topro: registered trademark of

Farmula
farming forward

Farmula B.V.
Sluiskolk 3-5
7681 KC Vroomshoop NL
info@topro.nl
www.topro.nl